

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-7-91048816



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 201

du 5 juillet 1991

VIGNE

Mildiou

Quelques tâches sont observées sur feuilles et quelques grappes attaquées. Bien souvent les échecs d'efficacité sont provoqués par des traitements insuffisants ; Protéger un rang sur deux ou sur trois ce n'est pas une stratégie recommandée surtout si l'on dépasse les 12 ou 14 jours pour les systémiques.

Oïdium

Maintenir la protection. Préférer les produits systémiques
Viser les grappes, restez attentifs jusqu'à la veraison.

Vers de la grappe

Vol de la deuxième génération, les pontes sont rares, vérifier leur présence avant d'intervenir, le nombre de glomérules observés reste faible (voir tableau des spécialités).

Cicadelles vertes

Lutter contre larves et non contre les adultes. Le seuil d'intervention est de 1 larve et demi par feuille sur 100 feuilles.

Cicadelles de la Flavescence dorée

Moins nombreuses mais plus dangereuses car elles transmettent la maladie, se trouve actuellement au stade 3, intervenir pour le second traitement (voir tableau des produits).

P. 33

Cochenilles

Les migrations des jeunes larves sur les parties aériennes du cep se poursuivent. Les fourmis servent aussi à les transporter. Intervenir dans les zones concernées traditionnellement.

OLIVIERS

Le calibre de jeunes olives augmente ; il est temps d'installer les gobes mouches

Surveiller les captures de mouches et présence de piqûres qui ne devraient pas tarder notamment sur Picholine.

PECHERS

Pas de capture de mouches méditerranéennes "cératitis capitata" dans les variétés précoces. Installer les gobes mouches dans les vergers en production pour surveiller leur présence, et intervenir seulement en cas de nécessité.

AGRUMES

Surveiller, contrôler, le calibre de vos jeunes fruits pour intervenir avec Fixofruit ou Corasil E (Voir bulletin n° 200.)

CULTURES MARAICHÈRES

Tomate de plein champ

Prévenir les risques de contamination de la maladie bronzée de la tomate - T.S.W.V. " Tomato Spotted Wilt Virus " en se procurant des plants sains chez les pépiniéristes sérieux.

CULTURES INDUSTRIELLES

Maïs

La végétation des maïs est très irrégulière. Les stades végétatifs évoluent de 12 feuilles à l'apparition des panicules mâles.

A ce dernier stade, il est temps de réaliser un traitement couplé " sésamie - pyrale " au moyen de (Pyrèthrinocides, Decis, Fastac, Baytroïde etc..)

Le traitement aérien "bas volume" 5 litres ha- est plus pratique que le traitement terrestre (voir bulletin n°198).